

## Mesures additionnelles contact - Pédiatrie : Services hospitaliers

### OBJET

Les patients porteurs de bactéries multirésistantes (BMR) ou de pathogènes à potentiel épidémique se transmettant par contact sont soumis à des **Mesures additionnelles CONTACT (MAC)** afin d'optimiser le potentiel de prévention de la transmission. Ce document vise à expliciter les procédures de prise en charge des enfants sous MAC hébergés dans le Département médico-chirurgical de Pédiatrie en tenant compte de la présence intensive des parents comme partenaire de soins.

### UNITÉS CONCERNÉES

PEDH, CHPH, SLSH, ENFC, SIPI, NATH

### UNITÉS EXCLUES (fiches techniques spécifiques)

PEDJ, CHPJ, PONJ, PED1, CHP1

### RESPONSABILITÉ

La mise en place et le maintien dans les normes des **Mesures additionnelles CONTACT** est sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement des unités concernées.

### PROCÉDURES

#### Modalités d'hébergement

- L'enfant est hébergé préférentiellement en chambre individuelle.
- L'enfant peut être cohorté avec des enfants porteurs de la même bactérie ou du même pathogène.
- L'enfant peut être hébergé en chambre commune à condition que la zone d'isolement soit clairement délimitée par un ruban rouge au sol.

#### Zone d'isolement

- La zone d'isolement comprend le mobilier (lit, table de nuit, fauteuil...), l'appareillage, le sac à déchets.
- La zone d'isolement ne comprend pas le chariot d'isolement ni le dossier patient informatisé type METAVISION ou SOARIAN.

#### Signalétique

La signalétique **Mesures additionnelles CONTACT** rappelle au personnel que des mesures particulières d'hygiène doivent être prises lors de tout contact avec l'enfant ou son environnement direct :

##### Soarian

- Activer l'indicateur d'isolement sous PeC (pour les unités sous METAVISION, indicateur activé par l'unité d'Hygiène hospitalière).

##### Chambre commune

- Ruban rouge au sol délimitant la zone d'isolement.
- Procédure d'entrée dans la zone d'isolement sur la partie supérieure du chariot d'isolement.
- Plaquette MAC sur le lit.
- Autocollant MAC sur le dossier/fiche de soins du patient.

##### Chambre individuelle

- Procédure d'entrée dans la zone d'isolement sur la partie supérieure du chariot d'isolement.
- Procédure de sortie de la zone d'isolement sur la face interne de la porte de la chambre.
- Fiche MAC A3 sur la face externe de la porte de la chambre.
- Plaquette MAC sur le lit.
- Autocollant MAC sur le dossier/fiche de soins du patient.

## Tenue de protection à l'attention du personnel y compris les marraines de Terre des Hommes

Toutes les unités concernées

- Blouse de protection pour tout contact avec l'enfant ou la zone d'isolement.
- Désinfection des mains avant tout contact avec l'enfant, au terme des soins et selon les recommandations habituelles (PEDH, CHPH, USLS, ENFC, SIPI).
- Désinfection des mains et avant-bras avant tout contact avec l'enfant, au terme des soins et selon les recommandations habituelles (NATH).

### Remarque :

*Pas de blouse de protection s'il s'agit uniquement de supprimer des alarmes (monitoring, pompes à perfusions), mais désinfection des mains au terme de l'activité.*

## Tenue de protection/comportement à l'attention des parents, de la fratrie et autres visiteurs potentiels

### **PEDH, CHPH, USALS, ENFC, NATH**

- Sauf exception, visite des parents et de la fratrie uniquement.
- Interactions avec les autres enfants/parents et séjour dans les zones communes du service à éviter à l'exception de l'Espace famille situé au BH11 considéré comme un lieu communautaire.
- Hygiène corporelle et vestimentaire quotidienne.
- **Désinfection des mains avant les soins, après les soins et à la sortie du périmètre d'isolement.**

### Remarque :

En présence de jumeaux, les parents administrent d'abord les soins à l'enfant en Précautions standard puis à l'enfant sous MAC en respectant les indications à l'hygiène des mains. En fonction de la bactérie ou du pathogène et de la clinique, restriction au détriment de l'enfant sous MAC concernant l'allaitement et le portage kangourou : contacter l'unité d'épidémiologie et hygiène hospitalière.

### **SIPI**

- Sauf exception, visite des parents et de la fratrie uniquement.
- Interactions avec les autres enfants/parents et séjour dans les zones communes du service à éviter à l'exception de l'Espace famille situé au BH11 considéré comme un lieu communautaire.
- Hygiène corporelle et vestimentaire quotidienne.
- **Blouse dès l'entrée dans la zone d'isolement** (sur décision des cadres médico-infirmiers SIPI). Pas de limitation concernant l'allaitement et le portage kangourou.
- **Désinfection des mains avant les soins, après les soins et à la sortie du périmètre d'isolement.**

## Organisation des soins

L'enfant sous **Mesures additionnelles CONTACT** est doublable à condition de respecter la tenue de protection et de se désinfecter les mains +/- les avant-bras (NATH) au terme des soins et selon les recommandations habituelles.

## Sortie de la zone d'isolement/transport

Indications

- Mesures diagnostiques
- Mesures thérapeutiques
- Mesures rééducatives

Contre-indications

- Mesures éducatives à l'Espace éducatif ou dans tout autre local commun du DMCP

Modalités de sortie de la zone d'isolement

- Enfant
  - Toilette corporelle journalière réalisée
  - Changement de la tenue vestimentaire journalier réalisé
  - Dans la mesure du possible, désinfection des mains à la sortie de la chambre



- Professionnel accompagnateur y compris transporteurs
  - Désinfection des mains avant et au terme du transport
  - Blouse de protection seulement si contacts corporels étroits prévus
- Parents accompagnateurs
  - Désinfection des mains avant et au terme du transport
  - Pas de bouse de protection
- Environnement direct de l'enfant
  - Changement de literie réalisé
  - Désinfection du cadre de lit réalisé

### **Matériel**

- Pourvoir la zone d'isolement du minimum de matériel (max pour 24h).
- Utiliser de préférence du matériel à usage unique.
- Dans la mesure des possibilités, dédier le matériel à usage multiple au patient sous **Mesures additionnelles CONTACT**.
- Après utilisation, déposer le matériel à usage multiple directement dans le bac de désinfection disposé au local sale (matériel immergeable) ou le désinfecter au moyen d'Ethanol 70% (matériel non immergeable). Ex : balance pour peser les Pampers.

### **Environnement**

- L'environnement direct de l'enfant est nettoyé/désinfecté quotidiennement selon les modalités habituelles en utilisant de l'Incidin 0.5% disponible au robinet-doseur du local sale.

### **Evacuation des déchets**

- Pas de particularité.

### **Evacuation du linge**

- Pas de particularité.

### **Transfert**

Sauf avis contraire de l'unité d'épidémiologie et hygiène hospitalière, le transfert d'un enfant sous **Mesures additionnelles CONTACT** n'est pas contre-indiqué.

### **Levée des Mesures additionnelles CONTACT**

- Faire retirer le rideau de lit par le Service Propreté et Hygiène.
- Jeter le matériel non désinfectable.
- Déposer le matériel à usage multiple immergeable dans le bac de désinfection disposé au local sale.
- Désinfecter le mobilier, l'appareillage et tout autre matériel non immergeable au moyen d'Incidin 0.5%.

## **DISTRIBUTION**

Prof. Umberto Simeoni, chef de service PED  
Prof. Pierre-Yves Zambelli, chef de service CHP  
Prof. Jean-François Tolsa, chef de service NAT  
M. Timothy Spina, ICS PED, CHP, ENFC  
Mme Lorena Rizzo, ICS adjointe PED  
Mme Marie-Christine Fazan, ICS SIPI  
M. François Legault, ICS NAT  
Mme Nathalie Bourguignon, ICS adjointe NAT